



FICHE TECHNIQUE DE L'ESPECE

La Vandoise



Description :	Famille des Cyprinidés. <i>Leuciscus leuciscus</i> . Les vandoises vivent en rivière. Elles aiment les eaux claires et pures mais aussi rapides, de vit de préférence sur des fonds de graviers. Grégaire, la vandoise vit en banc, parfois important (150 individus) lorsqu'elle est de petite taille.
Taille	de 4 cm à 20 cm
Poids moyen	100-200 g
Record connu	40 cm pour 1 kg
Durée de vie	de 10 à 16 ans
Alimentation	Se nourrir d'invertébrés, de larves d'insecte ou d'insectes (aussi bien aquatiques qu'aériens), elle fréquente aussi bien le fond que la surface.
Reproduction	A maturité sexuelle de la Vandoise est variable suivant les régions. Ainsi elle intervient vers 2 ans dans les régions méridionales alors qu'il faudra compter 4 ans dans les autres régions. La ponte est possible dans une eau à plus de 11°C est se produit en avril, voir mai ou juin pour d'autres régions. L'incubation peut durer jusqu'à 30 jours dans une eau à 12°C. La cohabitation de la Vandoise et du Chevesne est fréquente et est souvent au détriment de la Vandoise qui plus exigeante sur le plan écologique. 8 000 à 10 000 Ovocytes

La **vandoise** (*Leuciscus leuciscus*) est un poisson [potamodrome](#) d'[Europe](#) et d'[Asie](#). Il a été introduit en [Irlande](#) pour servir d'appât.

Les **vandoises** ont les yeux jaunes et le corps plus fin que les gardons auxquels elles ressemblent. Elles ont le ventre et les flancs argentés et si leurs nageoires dorsales et caudales sont d'un gris plutôt foncé, les nageoires pelviennes et anales sont d'une teinte jaune. Cette couleur se retrouve au niveau de l'iris. Sa bouche est petite et moins fendue que celle du chevesne.

Mode de vie

Les vandoises vivent en rivière. Elles aiment les eaux claires et pures mais aussi rapides, de vit de préférence sur des fonds de graviers. Grégaire, la vandoise vit en banc, parfois important (150 individus) lorsqu'elle est de petite taille. Durant la journée, la Vandoise peut rester relativement statique en attendant l'aube ou le crépuscule pour reprendre de l'activité. Pour se nourrir d'invertébrés, de larves d'insecte ou d'insectes (aussi bien aquatiques qu'aériens), elle fréquente aussi bien le fond que la surface. Sur un cours d'eau, aux beaux jours, la vandoise aime se tenir vers la surface à l'ombre des arbres tandis que l'hiver elle trouvera refuge dans le calme des profondeurs.

a maturité sexuelle de la Vandoise est variable suivant les régions. Ainsi elle intervient vers 2 ans dans les régions méridionales alors qu'il faudra compter 4 ans dans les autres régions. La ponte est possible dans une eau à plus de 11°C est se produit en avril, voir mai ou juin pour d'autres régions. L'incubation peut durer jusqu'à 30 jours dans une eau à 12°C.

La cohabitation de la Vandoise et du Chevesne est fréquente et est souvent au détriment de la Vandoise qui plus exigeante sur le plan écologique.

Biologie [\[modifier\]](#)

Grégaire, cette [espèce](#) aime nager près de la surface et préfère les eaux claires.

Elle se nourrit d'[insectes](#), de [vers](#), d'[escargots](#) et plus rarement de végétaux.

Source : <http://fr.wikipedia.org/wiki/Vandoise>